

ANTIDOTOS Y ANTAGONISTAS ESPECIFICOS (CENTRO DE INFORMACION Y ASISTENCIA TOXICOLOGICA) EN PUEBLA.

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
ACETAMINOFEN (PARACETAMOL)	N-acetilcisteina (400mg /2ml, 20%) (MUCOMYST) Para admistrarse vo o por sng
ACETAMINOFEN (PARACETAMOL)	N-acetilcisteina (viales de 200mg/ml , 30ml, 20% de solución PARA ADMISNTRACION IV
METAHEMOGLOBIINEMIA	Azul de Metileno (10mg/ml , 10ml . 1% Para adminstrar IV

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
Neurolépticos y medicamentos relacionados (fenotiazinas, butirofenonas, tioxantenos, indoles, dibenzoxapinas, benzamídicos)	Difenhidramina (100mg en 10ml) (10ml / 1 ml) Para administración iv
BENZODIACEPINAS	FLUMAZENIL (0,5MG- 5ML) Lanexat Para administrar iv
RODENTIICIDAS	FITOMETADIONA (VITAMINA K) 10MG/ ML Para administrar iv

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
LOXOSCELISMO.	DAPSONA TABS 100MG
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS (MANIFESTACIONES MUSCARINICAS)	Sulfato de Atropina (sol. Inyectable 1mg / ml) Para administrar iv

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS (REACTIVADORES DE LA ACETILCOLINESTERASA)	Obidoximas (TOXOGONIN) Sol. Inyectable de 250mg /1ml
METOCLOPRAMIDA	Difenhidramina Sol. Iny 10mg/ml- 100mg/10 ml Para administrar iv

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
Opioides: (Morfina, codeína, meperidina, fentanilo, loperamida, dextropropoxifeno, dextrometorfano)	Naloxona (Narcan, narcanti) (0.4mg/1mL) PARA ADMINISTRACION IV
ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS	Bicarbonato de sodio Solución inyectable al 7.5% (8.9%) IV Bicarbonato de sodio Solución inyectable al 7.5% 50 ml=44.5 mEq
HIERRO	Deferoxamina (desferal) fco amp. Liofilizado en 2.0 gr IV

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
METANOL Y ETILINGLICOL	4 metil pirazol (antizol. Fomepizol) 1 vial : 1500mg = 1.5 ml Para administrar iv
SULFONILUREAS	OCTREOTIDE (sandostatin) 1mg en 5ml) Para administrar iv o subcutanea

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
SERPIENTE CASCABEL	ANTIVYPMIN
SERPIENTE CORALILLO	CORALMYN
ALACRANISMO	ALACRAMYN
LATRODECTISMO (VIUDA NEGRA)	ARACMYN PLUS
LOXOSCELISMO (VIOLINISTA)	RECLUSMYN

TOXICO	ANTIDOTO /ANTAGONISTA
MEDICAMENTOS DIVERSOS.	CARBON ACTIVADO (POLVO)
Bloqueadores de canales de calcio: (verapamil, diltiazem, nifedipino)	Cloruro de calcio al 10% (Ampolletas de 1000mg=10mL) Para administración IV. O Gluconato de calcio.(Ampolletas de 1000mg=10mL) iv
Betabloqueadores (Propranolol, atenolol)	GLUCAGON (Frasco ampula con liofilizado con 1 mg de glucagón y jeringa con diluyente) IV
DIGOXINA	Anticuerpos antidigoxina, FragmentosFAB (Digibind vial de 38 mg en polvo para reconstituir)
Cianuro	Hidroxocobalamina (1 vial=2.5 g en 100ml de SS al 0.9%) IV
Isoniazida	VITAMINA B 6 (Piridoxina) Solución inyectable 1gramo en 10 mL, 100mg/mL).
HONGOS HEPATOTOXICOS	Penicilina G Sódica Cristalina 1000,000 UI FCO IV.
METALES PESADOS	D-penicilamina (Tabletas de 300mg) Para administración oral
	Acido -2-3dimercaptosuccínico (DMSA,Succimer)(Chemet) (Cápsulas de 100mg y 200 mg) Para administración oral

	Cálcico-disódico etilendiaminatetraacetato (CaNa ₂ EDTA): Solución inyectable. 200mg/MI (20%) 1 gr = 5ml Para administración IV
HEPARINA	PROTAMINA (Protamina 1000) Solución inyectable 5000UI en 5ml para administrar IV